

MAPS

99


SBORNÍK
VYSOKÉ ŠKOLY
ZEMĚDĚLSKÉ
V BRNĚ, ČSR.,
FAKULTA LESNICKÁ

BULLETIN
DE L'ÉCOLE SUPÉRIEURE
D'AGRONOMIE
BRNO, RČS.,
FACULTÉ DE SILVICULTURE.

1929

SIGN. D 13

Publicatio sectionis phytopathologicae instituti agronomici Brunae nr. 80.
Praefectus Doc. Dr. ED. BAUDYŠ



DR. RICHARD PICBAUER

ADDENDA AD FLORAM ČECHOSLOVAKIAE
MYCOLOGICAM, IV.

Cite as Sborn. chir. pohyb. Ustr.

Sb. vys. Šk. zeměd. Brne.

S PODPOROU MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ A NÁRODNÍ OSVĚTY VYDÁVÁ

VYSOKÁ ŠKOLA ZEMĚDĚLSKÁ

V BRNĚ, ČERNÁ POLE.

REDAKTOR — RÉDACTEUR
PROF. EM. BAYER V BRNĚ,
ČERNÁ POLE, ČSR.

NA SKLADĚ MÁ — EN VENTE CHEZ
KNIHKUPEC A. PÍŠA, NAKLADATEL
V BRNĚ, ČESKÁ 28, ČSR.

Publicatio sectionis phytopathologicae instituti agronomici Brunae nr. 80.
Praefectus Doc. Dr. Ed. Baudyš.

DR. RICHARD PICBAUER:

Addenda ad floram Čechoslovakiae mycologicam, IV.

Haec addenda addendorum priorum continuatio quidque ibi in praefatione dictum, id etiam in his addendis valet. Solum adnoto: Inventa sine nota territoriali ex Moravia oriuntur, abbreviatio Bd. BAUDYŠ, Pbr. PICBAUER legenda, fungique moravici ac silesiaci novi stella signati. Omnino LXXIII fungi nondum in Moravia observati his literis adnotantur duaeque species novae (*Rhabdospora primulae* Picbauer et *Ramularia lappulae* Picbauer) ac duae variationes novae (*Fusarium sclerodermatis* Oud. var. *lycoperdonis* Picbauer et *Phoma veronicae* Roum. var. *veronicae teucrii* PICBAUER describuntur.

Cl. Domino Doc. Dri Ed. BAUDYŠ, praefecto meo, qui mihi inventa sua mycologica benevolenter ad publicationem, respective determinationem commisit, hoc loco maximas gratias ago.

Brno, mense octobre 1928.

Myxomycetes.

Badhamia foliicola Lister. Ad folia *Brassicae oleraceae* in Brno (Bd).

**Fuligo muscorum* Alb. et Schw. Ad lignum detritum in montibus Jeseníky (Pbr).

**Lepidoderma tigrinum* (Schrad.) Rost. Ad lignum piceum musco obteectum infra monte Praděd in montibus Jeseníky (Pbr).

Lamproderma columbinum (Pers.) Rost. Ad corticem *Piceae excelsae* in ripa dextra fluminis Opavae infra monte Praděd in montibus Jeseníky (Pbr).

Cribraria aurantiaca Schrad. Ad caudices in silva vetusta infra Ovčárna in Jeseníky montibus (Pbr).

Arcyria ferruginea Sauter. Ad caudices detritos in montibus Jeseníky: infra Praděd, ad Karlova Studánka, infra Šerák monte (Pbr).

Trichia varia Pers. Ad corpora arborum decessarum ad fontes Opavae fl. infra Praděd monte (Pbr).

Trichia favoginea (Batsch.) Pers. In montibus Jeseníky satis disseminata: infra Praděd, ad Malá Morava, Červený vrch, Mechová stráň (Pbr).

Trichia decipiens (Pers.) Macbr. Ad corpora et caudices arborum decessos infra Praděd, ad Opavam flumen et in Mechová stráň (Pbr).

**Trichia floriformis* G. Lister. ad corpora arborum decessa infra Praděd monte; mense septembro bene evoluta (Pbr).

Plasmodiophora brassicae Woron. in radicibus *Nesliae paniculatae* ad Třešť (Bd).

Phycomycetes.

Synchytrium taraxaci D.B. et Woron. ad folia *Taraxaci officinalis* ad viam inter Brázdův mlýn et Nová Říše, in hortis sanatorii in Tišnov, Majetín ad Přerov (Bd).

Urophlyctis pulposa (Wallr.) Schröt. In caulibus *Chenopodii glauci* ad Rakvice pr. Břeclav, in Tišnov (Bd).

**Cladochytrium sparganii ramosi* Büsg. Ad folia *Sparganii ramosi* ad Nová Říše (Pbr).

Physoderma menyanthidis D.B. In foliis *Menyanthis trifoliatae* ad piscinam apud Dobrá Voda pr. Telč (Pbr).

Albugo candida (Pers.) Kuntze. Ad folia *Diplotaxidis tenuifoliae* ad Mikulov (Pbr).

Ad folia *Roripae amphibiae* in litore Bečvae fl. ad Lipník n. B. (Baudyš), ad Val. Meziříčí (Pbr).

Sclerospora graminicola (Sacc.) Schröt. In foliis *Setariae viridis* ad Řečkovice et Židenice pr. Brno (Bd), ad Příkluky pr. Břeclav (in communi excursionem primus Bd invenit), ad Mikulov (Pbr).

Plasmopara pygmaea (Unger) Schröt. Ad folia *Isopyri thalic-troidis* ad flumen Bobravam in silva infra Želešice pr. Brno (Pbr).

Plasmopara densa Rbh. Ad folia *Euphrasiae odontites* ad Zdeňkov pr. Telč (Bd).

Peronospora loti Syd. Ad folia *Loti corniculati* ad viam inter Vápovice et St. Říše (Bd).

Peronospora aestivalis Syd. Ad folia *Medicaginis falcatae* ad Pustina inter Týn et Lipník n./B. (Bd).

Peronospora lentis Gäum. Ad folia *Lentis esculentae* ad Dyjákovice pr. Znojmo. (Administratio fundi in Dyjákovice).

Peronospora Mayorii Gäum. Ad folia *Viciae segetalis* ad sanatorium in Tišnov (Bd).

Peronospora verna Gäum. Ad folia *Veronicae serpyllifoliae* ad Ottův mlýn pr. Třešť (Bd).

Peronospora ranunculi Gäum. Ad folia *Ranunculi bulbosi* ad Znojmo, Hradiště, Devět mlýnů, Trouznický mlýn pr. Znojmo (Pbr).

Peronospora arborescens (Berk.) D. B. Ad folia *Papaveris somniferi* ad Žabčice pr. Židlochovice. (Administratio fundi Žabčice.)

Peronospora affinis Rosam. Ad folia *Fumariae officinalis* ad Želešice pr. Brno (Bd. et Pbr).

Peronospora dentariae Rbh. Ad folia *Cardaminis pratensis* ad Valečov pr. Něm. Brod in Bohemia, ad Tršice pr. Olomouc et ad Lipník n./B. (Bd).

Peronospora nesleae Gäum. Ad folia *Nesliae paniculatae* ad Pa-lečkův mlýn pr. Třebíč (Pbr).

Peronospora symphyti Gäum. Ad folia *Symphyti tuberosi* ad Spálený mlýn pr. Střelice ad Brno (Pbr).

Peronospora asperuginis Schröt. Ad folia *Asperuginis procumbentis* ad Želešice pr. Brno (Bd et Pbr), ad textinum in Náměšt n./O. (Pbr).

Peronospora valerianellae Gäum. Ad folia *Valerianellae olitoriae* in convalli Bobravae fl. ad Želešice pr. Brno (Bd et Pbr).

Peronospora aquatica Gäum. Ad folia *Veronicae annagallidis* in pratis infra schola in Nov. Říše (Bd).

Peronospora silvestris Gäum. Ad folia *Veronicae officinalis* in silva a Nov. Říše ad meriones versus (Bd).

***Peronospora Raddii** D. B. Ad petala florum *Matricariae inodorae* ad serratam latifundii in Třešť (Bd).

Peronospora chenopodii boni Henrici Gäum. Ad folia *Chenopodii boni Henrici* in vicina Zdeňkov pr. Telč, in Třebíč et Trnava pr. Třebíč (Pbr).

Pseudoperonospora humuli Myabe et Takah. Ad folia *Humuli lupuli* in convalli Bobravae fl. ad Želešice pr. Brno, ad Rakvice pr. Břeclav (Bd), in colle Květnice ad Tišnov (Bd).

Peronospora meliloti Syd. Ad folia *Meliloti albi* loco arenoso inter Týn et Lipník n./Bečvou (Bd).

Peronospora minor (Caspary) Gäum. Ad folia *Atriplicis roseae* in declivitate ad Dyje flumen pr. Znojmo (Pbr).

Ascomycetes.

Protomyces pachydermus Thüm. Ad scapos *Taraxaci officinalis* in hortis sanatorii in Tišnov (Bd).

Protomyces Kriegerianus Büren. Ad folia viva *Leontodontis hispidi* ad Náměšť n. O. (Pbr).

Leontodontis hastilis in hortis sanatorii in Tišnov (Bd).

Taphrina Tosquetii (West.) Magn. Ad folia *Alni glutinosae* in silva Hrabyně ad Čes. Těšín (leg. Nakládal).

Taphrina Rostrupiana (Sadeb.) Giesenhagen. Ad fructus *Pruni spinosae* in colle Květnice ad Tišnov (Bd et Hoffmann).

***Taphrina crataegi** Sadeb. Ad folia *Crataegi oxyacanthae* ad castellum in Třešť, in colle Květnice ad Tišnov (Bd), ad Úsobrno pr. Jevíčko (ing. Kalandra).

Taphrina minor Sadeb. Ad folia *Pruni fruticosae* ad Znojmo et Šatov (Pbr).

Elaphomyces variegatus Vittad. In silva Černochoy ad Netín pr. Vel. Meziříčí (Pbr).

Elaphomyces cervinus (Pers.) Schröt. Humi in silva pinastri ad Rápotice pr. Náměšť n./Oslavou (Pbr), in silva pinastri ad Vel. Bíteš.

Sphaerotheca Humuli (D. C.) Burr. Ad folia *Sanguisorbae officinalis* ad Nová Říše (Pbr).

Trichocladia evonymi (D. C.) Neger. Ad folia *Evonymi europaei* ad Dukovany pr. Mor. Krumlov (Pbr).

Microsphaera grossulariae Lévl. Ad folia *Ribis grossulariae* in hortis in Třebíč (Pbr).

Podosphaera myrtillina Kunze. Ad folia *Vaccinii myrtylli* ad Javořice collem pr. Telč, ad Rancířov pr. Jihlava (Pbr).

Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc. Ad folia *Carpini betuli* ad Píšťany (leg. Fuksa).

Ad folia *Fagi silvaticae* in silva Godula ad Čes. Těšín (leg. Nakládal).

Chaetomium comatum (Tode) Fr. Ad lignum domi humidae in Král. Pole ad Brno.

***Didymella Bryoniae** Rehm. Ad caules *Bryoniae dioicae* in declivitate Vinohrady ad silvam Wilsoni ad Brno (Pbr).

* *Cucurbitaria rufofusca* (Fr.) Ces. et de Not. Ad ramos *Berberidis vulgaris* ad Sloup (Pbr).

Guignardia astragalina Rehm. Ad folia *Astragali ciceris* ad Dol. Dunajovice pr. Mikulov (Pbr).

Lophiotrema vagabundum Sacc. Ad caules *Epilobii hirsuti* ad Světlav pr. Bojkovice (Pbr).

Mycosphaerella Pulsatillae (Lasch.) Johans. Ad folia *Pulsatillae vulgaris* in clivo Kamenný kopec ad Brno (Pbr).

Ophiobolus Cirsii (Karst.) Sacc. Ad caules *Cirsii palustris* in convalli Březník ad castellum pr. Třešť (Bd).

Ophiobolus Cesatianus (Mont.) Sacc. Ad caules *Cirsii lanceolati* in voragine inter Rajhrad et Želešice pr. Brno (Pbr).

Ophiobolus fruticum Sacc. Ad caules *Ononidis spinosae* ad Hovorany pr. Hodonín (Pbr).

Ophiobolus porphyrogonus (Tode) Sacc. Ad caules *Chaerophylli temulenti* inter Blansko et Olomučany (Pbr).

Leptosphaeria doliolum (Pers.) Ces. et de Not. Ad caules *Epilobii angustifolii* in silva Chudoba ad Třebíč (Pbr).

Ad caules *Angelicae silvestris* in convalli „Březník“ ad castellum in Třešť (Bd).

* *Leptosphaeria aucta* (Niessl) Karst. Ad caules *Clematidis rectae* in declivitate Žižkovo návrší, Hády, Hornek ad Ochoz pr. Brno (Pbr).

* *Leptosphaeria aparines* (Fuck.) Sacc. Ad caules *Galii aparines* in silva Wilsoni ad Brno. Spor. 38μ longis ac 7.7μ latis (Pbr).

Pleospora herbarum Rbh. Ad caules *Linariae genistaefoliae* ad Set. Florianek pr. Mor. Krumlov (Pbr).

Ad caules *Polygonati officinalis* ad Olomučany pr. Blansko (Bd).

Ad caules *Lilii martagonis* ad Rokytná fl. pr. Mor. Krumlov (Pbr).

Ad caules *Potentillae argenteae* in Vranovice ad Brno (Pbr).

Ad scapos *Plantaginis mediae* in clivo Tuřold ad Mikulov (Pbr).

Ad scapos *Plantaginis maioris* in Kuřim et Tetčice pr. Brno (Pbr).

Ad caules *Brunellae grandiflorae* in declivitate Kamenný kopec ad Brno (Pbr).

Ad caules *Betonicae officinalis* in declivitate Hornek supra Říčka fl. ad Brno (Pbr).

Ad caules *Thymi chamaedrys* et *Clinopodii vulgaris* eodem loco (Pbr).

Ad caules *Verbenae officinalis* in Vranovice pr. Brno (Pbr).

Ad caules *Lithospermi purpureocoerulei* in clivo Hornek supra Říčka flumine ad Brno (Pbr).

Ad caules *Trifolii alpestris* in Kamenný kopec ad Brno (Pbr).

Ad caules *Ranunculi nemorosi* in declivitate Kamenný kopec pr. Brno (Pbr).

Ad caules *Scabiosae ochroleucae* in clivo Hády pr. Brno (Pbr).

Ad caules *Cichorii intybi* in clivo Žlutý kopec ad Brno (Pbr).

*f. *Armeriae* Sacc. Ad scapos *Armeriae vulgaris* in pratis ad Přitluky pr. Břeclav, in declivitate Leskoun ad Vedrovice pr. Mor. Krumlov (Pbr).

**Pleospora palustris* Berl. Ad caules *Junci Gerardi* ad Rakvice pr. Břeclav (Pbr).

Pleospora media Niessl. Ad caules *Globulariae Willkommii* ad Sulov pr. Žilina in Slovakia occid., in clivo Svatý kopeček ad Mikulov (Pbr).

Ophiochaete herpotricha (Fr.) Sacc. Ad culmos foliaque *Festucae giganteae* in convalli Pustý zleb ad Macocham, locum praeruptum (Pbr).

Pyrenophora pellita (Fr.) Sacc. Ad caules *Papaveris somniferi* in colle Kotelná et ad Dol. Vistonice in collibus Pavlovské kopce (Pbr).

Pyrenophora comata (Auersw. et Niessl) Sacc. Ad scapos *Pulsatillae vulgaris* ad Čebín pr. Tišnov (Bd et Pbr).

Diaporthe oncostoma (Duby) Fuck. Ad ramos *Robiniae pseud-acaciae* in silva Wilsoni ad Brno (Pbr).

**Diatrypella pulvinata* Nitschke. Ad ramulos *Querci* sp. in clivo Žižkovo návrší ad Brno (Pbr).

Valsa Kunzei Fr. Ad ramos *Abietis albae* infra Suchý monte in Fatra montibus (Pbr).

Valsa ambiens (Pers.) Fr. In cortice *Crataegi oxyacanthi* in colle Kraví hora ad Brno (Pbr).

Ad ramos *Tiliae parvifoliae* in Nová Říše (Bd).

Valsa salicina (Pers.) Fr. Ad ramulos *Salicis capreae* in convalli Březník ad castellum in Třešť (Bd).

Valsa cincta Fr. Ad ramos *Piri mali* in Vinohrady ad silvam Wilsoni pr. Brno (Pbr).

Pseudovalsa irregularis (D. C.) Schröt. Ad ramos *Robiniae pseud-acaciae* in declivitate Kamenný kopec ad Brno (Pbr).

Fenestella macrospora Fuck. Ad ramulos *Tiliae parvifoliae* in Nová Říše (Bd).

**Fenestella minor* Tul. Ad ramulos *Alni glutinosae* ad stationem Letovice pr. Boskovice (Pbr).

Calospora platanoideis (Pers.) v. H. Ad ramulos *Aceris pseudo-platanis* in convalli Březník ad castellum in Třešť, ad Okrouhlice pr. Nēm. Brod (Bd).

Melanconis stilbostoma (Fr.) Tul. Ad ramos *Betulae pendulae* in silva Wilsoni ad Brno (Pbr).

Dothidella thoracella Fr. Ad caules *Sedi maximi* in convalli inter Červený Hrádek et Nová Říše, ad sanatorium in Jevíčko (Bd).

Plowrightia ribesia Sacc. Ad ramulos *Ribis rubri* in Třešť (Bd).

Hypomyces viridis (Alb. et Schw.) B. et Br. Ad corpora *Russulae spec.* ad Stará Říše (Bd), ad Dědkov pr. Vel. Meziříčí (Pbr).

***Hypomyces aurantius** (Pers.) Tul. Ad corpus *Sterei sp.* ad Červený mlýn pr. Jihlava (Pbr).

Ad corpus *Polypori squamosi* inter Vranovice et Uherčice, pr. Židlochovice (Pbr).

Hypoxylon coccineum Bull. Ad ramulos *Alni glutinosae* pr. stationem Letovice ad Boskovice (Pbr).

Nectria punicea (Kunze et Schm.) Fr. Ad ramos *Aesculi hippocastani* ad Netin pr. Vel. Meziříčí (Pbr).

Pleonectria ribis (Niessl) Karst. Ad ramulos *Ribis rubri* in declivo Koží hora ad Žabovřeský pr. Brno (Pbr).

Claviceps sesleriae Stäger. In spicis *Sesleriae coeruleae* in declivitate calcarea ad Šutov infra Fatra montibus in Slovakia sept. (Pbr).

Claviceps purpurea Tul. In fructibus *Glyceriae fluitantis* ad Český Těšín (Nakládal).

Agropyri repentis ad castellum in Třešť (Bd).

Triticum vulgaris ad Něčice pr. Kroměříž (Bd).

Hordei distichi ad Morkovice (Bd).

Avenastrum planiculmis in Vysoká Hole monte in Jeseníky montibus (Pbr).

Claviceps microcephala Wallr. In fructibus *Anthoxanthi odorati* in Javořice colle ad Telč (Pbr).

Nardi strictae in Javořice colle ad Telč (Bd et Pbr).

Moliniae coeruleae ad Svatobořice pr. Kyjov, ad Kúty in Slovakia occid. (Pbr).

Holci lanati in pratis ad castellum in Třešť (Bd), in Javořice colle et in locis Telč oppido propinquis (Bd et Pbr).

Epichloë typhina Tul. Ad culmos *Festucae ovinae* ad sanatorium in Tišnov (Bd).

Calamagrostidis Hallerianae ad Plavy pr. Žel. Brod in Bohemia (Bd).

Lophodermium melaleucum (Fr.) De Not. Ad folia *Vaccini vitis idaeae* in silvis inter Sázava et Žďár in Moravia (Pbr).

Lophodermium arundinaceum (Schrad.) Chév. Ad folia *Hierochloidis odoratae* in declivitate Kamenný kopec ad Brno (Pbr).

Lophodermium nervisequium (D. C.) Rehm. Ad folia *Abietis pectinatae* in declivitate Hornek supra Říčka fl. ad Brno (Pbr).

***Scleroderris fuliginosa** (Fr.) Karst. In statu conidiali in ramulis *Salicis americanae* ad Skalička pr. Hranice.

Scleroderris ribesia (Pers.) Karst. In ramis *Ribis grossulariae* in Žižkovo návrší ad Brno (Pbr).

Rhytisma symmetricum J. Müller. Ad folia *Salicis purpureae* ad Bečva flumen pr. Krásno ad Val. Meziříčí (Pbr).

***Biatorella resinae** (Fr.) Mudd. Ad resinam *Piceae excelsae* in silva Strážnice ad Netín pr. Vel. Meziříčí (Pbr).

Dermatea cerasi (Pers.) De Not. Ad ramulos *Pruni avium* in declivitate Žižkův vřeh ad Brno (Pbr).

Ascophanus carneus (Pers.) Boud. Ad fimum vaccinum pr. Rošička fundum ad Telč (Pbr).

Peziza vesiculosa Bull. In caldariis in Brno (Pbr).

***Dasysepypha Bubaki** Klika. Ad ramos *Pini pumilionis* in Suchý et Fatranský Kriváň monte in Fatra montibus (Pbr); in Šerák monte in Jeseniky montibus (Pbr).

Dasysepypha Willkomii (Hartig) Schröt. Ad ramulos *Pini silvestris* ad Netín pr. Vel. Meziříčí (Pbr).

***Lachnum echinulatum** Rehm. Ad folia *Aceris pseudoplatani* decessa in convalli a Zborovice Morkovice versus (Pbr et Bd).

Coryne sarcoides (Jacq.) Tul. Ad caudicem betulinum ad Jihlava et ad Krémaň pr. Olomouc (Pbr).

var. **urnalis** Nyl. Ad caudices in declivitate Heulos ad Jihlava oppidum (Pbr).

Tapesia rosae (Pers.) Fuck. Ad ramos *Rosae* sp. in convalli Kožichovský žleb pr. Třebíč (Pbr).

Mollisia lignicola Phil. Ad caudicem in silva pr. Mouřinov ad Bučovice (Pbr).

Fabraea ranunculi Karst. Ad folia *Ranunculi auricomi* ad Netín pr. Vel. Meziříčí (Pbr).

Fabraea cerastiorum (Wallr.) Rehm. Ad folia *Cerastii caespitosi* var. *serpentini* ad Rojetín pr. Tišnov (Dr. Suza).

***Pyrenopeziza nigrella** Fuck. Ad caules *Galeopsidis* sp. in silva ad Klučov pr. Třebíč (Pbr).

Cudonia circinnans (Pers.) Fr. Humi in silva ad Karlova Studánka infra Praděd (Pbr).

Basidiomycetes.**Ustilagineae.**

Ustilago aculeata (Ule) Liro. Ad folia viva *Agropyri repentis* ad Zvolenovice prope Telč, ad sanatorium in Tišnov (Bd); ad Světlá prope Telč (Pbr).

Ustilago decipiens Liro. In ovariis *Arrhenatheri elatioris* in hortis sanatorii in Tišnov (Bd).

Ustilago hypodytes (Schlecht.) Fr. Ad culmos *Agropyri repentis* ad Huňevotín pr. Olomoue (Pbr).

Ustilago panici milliacei (Pers.) Wint. In ovariis *Panici milliacei* in agris inter molam Podhajský mlýn et Uhřeice pr. Jevíčko (Bd).

Ustilago panici glauci Wint. In ovariis *Panici glauci* ad Přítluky pr. Břeclava (Pbr).

Ustilago calamagrostidis (Fuek.) Clint. Ad folia *Calamagrostidis epigaeos* in declivitate Kamenný kopece ad Bohonice pr. Brno (Pbr).

Ustilago striaeformis (West.) Niessl. Ad folia *Poaе bulbosae* ad Bohutice pr. Mor. Krumlov (Pbr).

Ustilago airae caespitosae Bub. Ad folia *Airae caespitosae* in itore rivi Vápovka infra Nová Říše (Bd).

Ustilago luzulae Sacc. In ovariis *Luzulae pilosae* ad Býčí skála pr. Blansko, ad Jiřice pr. Telč, infra monte Javořice ad Mrákotín (Pbr).

Ustilago salvei Berk. et Br. Ad folia *Dactylidis glomeratae* ad Bohutice pr. Mor. Krumlov (Pbr).

Ustilago carnea Liro. In ovariis *Polygoni convolvuli* ad Nová Říše pr. Telč, infra arce Boskovice (Bd), ad Podskalčí mlýn (Bd. et Pbr), ad Spálený mlýn pr. Troubsko ad Brno (Pbr).

Ustilago reticulata Liro. In ovariis *Polygoni persicacfoliae* ad Brázdův mlýn pr. Nová Říše (Bd).

Ustilago ornithogali (Schmidt et Kunze) Magn. Ad folia *Gageae minimae* in aestatisilva ad Želešice pr. Brno (Pbr).

Ustilago Vaillantii Tul. In ovariis *Muscari racemosi* infra Klučina declivitate ad Tišnov (Bd).

Ustilago major Schröt. In ovariis *Silenis otitis* in declivitate Devět mlýnů pr. Znojmo et ad Rakšice pr. Mor. Krumlov (Pbr).

Ustilago Holostei D. B. In ovariis *Holostei umbellati* in declivitatibus inter Znojmo et Hradiště (Pbr).

Ustilago violacea (Pers.) Roussel. In antheris *Dianthi Pontenderae* in declivitate ad Devět mlýnů pr. Znojmo (Pbr).

**Ustilago pallida* Lgh. In antheris *Viscaria vulgaris* in declivitatibus ad Devět mlýnů pr. Znojmo (Pbr).

**Ustilago coronariae* Liro. In antheris *Lyclnidis floris cuculi* pr. Zborovice (Pbr).

Ustilago scabiosae (Sow.) Wint. In antheris *Knautiae arvensis* in pratis inter Skalice et Boskovice ad viam ferream (Bd), infra Kamenný kopec ad Bosonohy pr. Brno (Pbr).

Sphacelotheca hydropiperis (Schum.) D. B. In ovariis *Polygoni hydropiperis* in Zdeňkov pr. Telč (Bd).

Anthracoideae caricis Brev. In ovariis *Caricis pilosae* inter Olomučany et Býčí skála (Pbr).

Caricis tomentosae ad Sct. Antoníček pr. Brno (Bd).

Schizonella melanogramma (D. C.) Schröt. Ad folia *Caricis montanae* in Kamenný kopec ad Bosonohy pr. Brno (Pbr).

Caricis digitatae in declivitate Klucanina ad Tišnov (Bd).

Caricis sp. ad Chvalkovice pr. Olomouc (Pbr).

Sorosporium dianthorum Cifferi. In ovariis *Dianthi carthusianorum* in declivitate ad viam a Smolná Jevíčko versus (Bd).

Dianthi deltoidis ad Bohuslavice pr. Nová Říše, in litore supra Vápovka rivo ad Nová Říše, ad Zdeňkov pr. Nová Říše et Sedlatice pr. Stará Říše (Bd).

Sorosporium alsinearum Cifferi. In inflorescentia *Cerastii arvensis* ad viam a Lavičky Vel. Meziríčí versus (Pbr), in clivo Hřebenáč a vicinā Sloup ad meriones versus (Bd. et Pbr).

Tolyposporium leptideum Sydow. In ovariis *Chenopodii albi* ad Nový Přerov (Bd), in Rakvice (Bd et Pbr), in Břeclava, Valtice et Dubňany pr. Hodonín (Pbr).

Thecaphora affinis Schneider. In fructibus *Astragali glycyphylli* ad viam ferream a Skalice Boskovice versus (Bd).

Tilletia decipiens (Pers.) Wint. In ovariis *Agrostidis vulgaris* in pratis infra „Valy“ a Bojkovice ad meriones versus (Bd), in declivitate Staré hory ad Mohelno (Pbr), ad Mrákotín, Rosička fundum et Světlá pr. Telč (Bd. et Pbr).

Entyloma calendulae (Oud.) D. B. In foliis *Calendulae officinalis* in Jevíčko (Bd).

**Entyloma Magnusii* Woron. In radice *Gnaphalii luteoalbi* in agris inter Čejč et Mutěnice, inter Dubňany et Svatobořice pr. Kyjov (Pbr).

Entyloma serotinum Schröt. In foliis *Symphyti officinalis* ad Dubňany pr. Hodonín (Pbr).

Entyloma ranunculi (Bonord.) Schröt. In foliis *Ranunculi ficariae*

ad Znojmo et ad molam Trouznický mlýn pr. Znojmo, ad Hradiště pr. Znojmo (Pbr).

Tuburecinia junci (Lgh.) Liro. Ad folia *Junci filiformis* infra Světlá ad Telč (in communi excursione Pbr primus invenit), ad Olši pr. Vel. Meziříčí (Pbr).

Tuburecinia Fischeri (Körnicker) Liro. Ad folia *Caricis glaucae* ad marginem silvae ad castellum Světlav pr. Bojkovice (Bd).

Tuburecinia ranunculi Liro. In foliis *Ranunculi repentis* in convalli Pustý Žleb inter Sloup et Macocha, locum praeruptum, ad domum venatorium Sct. Magdalene inter Krásonice et Nová Říše (Bd).

Tuburecinia ranunculi auricomi Liro. In foliis *Ranunculi auricomi* ad domum venatorium domini Kroutil infra Třešť (Bd).

Tuburecinia agropyri (Preuss) Liro. In foliis *Agropyri repentis* ad Nová Říše pr. Telč (Bd).

Tuburecinia alopecuri Liro. In foliis *Alopecuri pratensis* ad Kotlas fundum ad Ždár vicinam pr. Něm. Brod (Bd et Pbr).

Tuburecinia colchici (Schlecht.) Liro. Ad folia *Colchici autumnalis* in pratis inter Jedovnice et Křtiny (Bd et Pbr).

Doassansia punctiformis (Niessl) Schröt. Ad caules *Butomi umbellati* ad Jezero pr. Rakvice ad Břeclav, ad piscinam Nohavička ad Ptáčov pr. Třebíč (Pbr).

Uredinales.

Melampsorella caryophylleacearum (D. C.) Schröt. Ad folia *Cerastii arvensis* ad vicinam Sázava in Bohemia, ad Ždár, Nov. Město, in Květnice colle ad Tišnov, ad Třebíč (Pbr).

Melampsorella symphyti (D. C.) Bub. Ad folia *Symphyti officinalis* ad Lipník n. B. (Bd).

Ad folia *Symphyti tuberosi* ad Dyje fl. inter Devět mlýnů et Znojmo (Pbr).

Melampsorium betulinum (Pers.) Kleb. Ad folia *Betulae carpathicae* in voragine Kotlina dicta in montibus Jeseníky (Pbr.)

Melampsora Magnusiana Wagner. Caemata ad folia *Corydalis cavae* in silva ad Bobravam fl. pr. Želešice ad Brno (Pbr).

Calyptospora Goeppertiana Kühn. Ad ramules *Vaccinii vitis idaeae* inter vicinam Čechomez et Ždár oppidum satis disseminata (Pbr).

Thecopsora vacciniorum (D. C.) Karst. Ad folia *Vaccinii uliginosi* in montibus Jeseníky satis disseminata, sic in Vel. et Malý Jezerník, Šerák montibus (Pbr).

Ad folia *Vaccinii vitis idaeae* in monte Šerák et Vel. Jezerník in Jeseníky montibus (Pbr).

Coleosporium inulae (Kuntze) Ed. Fischer. Ad folia *Inulae ensifoliae* in Šibeníčník elivo ad Mikulov (Pbr).

Ad folia *Inulae Hookeri* in horto botanico scholae agronomicae in Brno (Pbr).

Phragmidium fragariastrum (D. C.) Schröt. Ad folia *Potentillae micranthae* in fagetis supra Rokytnice ad Slavičín in Carpathis moravieis (leg. Staněk).

Potentillae albae ad Jamolice, Dukovany pr. Mor. Krumlov (Pbr).

***Phragmidium rosae pimpinellifoliae** (Rbh.) Diet. Caeomata ad ramos *Rosae pimpinellifoliae* ad locum natatorum pr. Znojmo, ad marginem silvae „Hájky“ ad Dukovany pr. Mor. Krumlov (Pbr).

Phragmidium subcorticium (Schränk) Wint. Ad folia *Rosae coriifoliae* ad Brázdův mlýn pr. Nov. Říše (Bd).

Gymnosporangium amelanchieris (D. C.) E. Fisch. Ad folia *Cotoneastri integerrimae* in colle Baba supra pag. Omšená pr. Trenč. Teplice in Slovakia occid. (leg. Dr. Suza).

In fructibus *Crataegi oxyacanthae* in elivo Kamenovská ad Dědkov pr. Vel. Meziříčí. Fructus fere omnes infecti, sed folia fere intacta.

Uromyces silenes (Schlecht.) Fuck. In foliis *Silenis nutantis* ad Úsobrno pr. Jevíčko (Bd).

Uromyces armeriae (Schlecht.) Lév. Ad folia *Armeriae vulgaris* ad Přítluky pr. Břeclav, ad Kúty in Slovenia occident., in declivitatibus Obří hlava et Král. stolice pr. Znojmo (Pbr).

Uromyces dactylidis Otth. Ad folia *Dactylidis glomeratae* in voragine Kotlina dicta in Jeseníky montibus, ad Mikulov, Val. Meziříčí (Pbr); ad Jevíčko (Bd).

Uromyces genistae tinctoriae Wint. In foliis *Cytisi capitati* in hortis in Červený kopec ad Jevíčko, in declivitatibus inter Smolná et Jevíčko (Bd).

Uromyces astragali (Opiz) Sacc. Ad folia *Astragali glycyphyllos* ad Rakšice et Bohutice pr. Mor. Krumlov, ad Příkluky pr. Břeclav, ad Krásno (Pbr); ad Smolná pr. Jevíčko (Bd).

***Uromyces galegae** (Opiz) Sacc. Ad folia *Galegae officinalis* ad Příkluky pr. Břeclav (Pbr).

Uromyces minor Schröt. Ad folia *Trifolii montani* ad Devět mlýnů et Hradiště ad Znojmo (Pbr).

Uromyces veratri D. C. Ad folia *Veratri Lobeliani* in voragine Kotlina dicta in montibus Jeseníky (Pbr).

Uromyces ononidis Pass. Ad folia *Ononidis spinosae* ad Mikulov,

Valčice, Rohatec, Rakvice, Val. Meziříčí et Krásno in Moravia, ad Kúty in Slovenia occidentali (Pbr).

Uromyces alchemillae (Pers.) Schröt. Ad folia *Alchemillae vulgaris* ad Uherčice pr. Znojmo (Pbr).

Uromyces thapsi (Opiz) Bub. Ad folia *Verbasci thapsiformis* ad sanatorium in Jevíčko (Bd).

Uromyces scrophulariae (D. C.) Wint. Ad folia *Scrophulariae nodosae* in litore Úsobrnkae fl. infra Jaroměřice ad Jevíčko (Bd).

Uromyces ficariae (Schum.) Lévl. Ad folia *Ranunculi ficariae* ad Znojmo et locis propinquis satis disseminata (Pbr).

Uromyces gageae Beck. Ad folia *Gageae luteae* in silva ad Bo-bravam fl. pr. Želešice ad Brno (Pbr).

Uromyces scutellatus (Schränk) Lévl. Ad folia *Euphorbiae esulae* ad Úsobrno pr. Jevíčko (leg. Ing. Kalandra).

Ad folia *Euphorbiae virgatae* ad Znojmo, Šatov et Devět mlýnů ad Znojmo, ad Rakšice pr. Mor. Krumlov (Pbr).

Ad folia *Euphorbiae cyparissias* *iusdem locis* (Pbr).

Uromyces cristatus Schröt. et Niessl. Ad folia *Viscaria vulgaris* in declivitatibus inter Palečkův mlýn et Dobrá Voda ad Třebíč (Pbr).

Puccinia asparagi D. C. Ad folia caulesque *Asparagi officinalis* in declivitate Brennhügel ad Mikulov, Valtice (Pbr).

Puccinia thesii (Des.) Chaill. Ad folia *Thesii linophylli* in nemore ad Želešice pr. Brno (Pbr).

Puccinia nigrescens Kirchn. Ad folia *Salviae verticillatae* ad Krásno pr. Val. Meziříčí (Pbr).

Puccinia porri Winter. Ad folia *Allii sativi* in Chotěbuz vicina in Silesia (leg. Nakládal).

Puccinia soldanellae (D. C.) Fuck. Ad folia *Soldanellae montanae* in silvis ad rivum a Pitkovský mlýn ad Mrákotín inter septentrionales et occidentem pr. Telč. (in communi excursionem Bd primus invenit); supra Železná Ruda in Bohemia (leg. Maloch).

Puccinia punctata Link. Ad folia *Galii Wirtgeni* in clivo Schaf-berg ad Vistonice pr. Mikulov (Pbr).

Ad folia *Galii scabri* ad Troubsko pr. Brno (Pbr).

Puccinia galli silvatici Otth. In foliis *Galii silvatici* in nemore inter Libštejn et Jaroměřice ad Jevíčko (Bd).

Puccinia major Diet. Ad folia *Crepidis paludosae* supra Javoří serra in montibus Šumava (leg. Maloch).

Puccinia menthae Pers. Ad folia *Origani vulgaris* inter Krásno et Hrachovec pr. Val. Meziříčí (Pbr).

Ad folia *Clinopodii vulgaris* eodem loco (Pbr), in silva infra Godula ad Čes. Těšín (leg. Nakládal).

Memorable: Ad Krásno teleutosporae in *Clinopodio* mense octobrem iam bene evolutae, sed in *Origano* uredosporae solum.

Puccinia Zopffii Winter. Ad folia *Calthae palustris* in voragine Kotlina dicta in Jeseníky montibus (Pbr).

Puccinia aromatica Bub. Ad folia *Chaerophylli aromatici* ad Spálený mlýn ad Bobravam fl. pr. Brno (Pbr).

Puccinia pimpinellae (Strauss) Mart. Ad folia *Pimpinellae nigrae* ad Rohatec pr. Hodonín (Pbr).

Puccinia dactylidina Bub. Ad folia culmosque *Dactylidis glomeratae* ad Devět mlýnů pr. Znojmo (Pbr).

Puccinia glumarum Eriks. et Henn. Ad folia *Triticum vulgaris* ad Višňová pr. Mor. Krumlov (Bd).

Puccinia perplexans Plowr. Ad folia *Alopecuri pratensis* ad Červený Hrádek pr. Nová Říše (Bd).

Puccinia pygmaea Eriks. Ad folia *Calamagrostidis Hallerianae* in Vysoká Hole, Šerák monte in Jeseníky montibus (Pbr).

Puccinia arrhenatheri (Kleb.) Eriks. In aecidiis ad folia *Berberidis vulgaris* ad Znojmo satis disseminata (Pbr). Ad Čes. Těšín in Silesia (leg. Nakládal).

Puccinia Baryi (Berk. et Br.) Winter. Ad folia *Brachypodii silvatici* inter Krásno et Hrachovec ad Val. Meziříčí (Pbr), in colle Hég ad Jevíčko (Bd).

Puccinia Magnusiana Körnicke. Ad folia *Phragmitis communis* ad Rakvice et Břeclav (Pbr).

Puccinia Traillii Plowr. Ad folia *Phragmitis communis* ad piscinam apud Dobrá Voda pr. Telč (Pbr).

Puccinia graminis Pers. Ad folia *Triticum canini* ad Stará Říše pr. Telč (Bd).

Ad folia *Triticum glaucum* ad Hradiště pr. Znojmo (Pbr).

Puccinia anthoxanthi Fuck. Ad folia *Anthoxanthi odorati* in regione inter Mor. Budějovice, Nová Říše, Dačice, Telč, Javoříce collem vulgo disseminata (Pbr).

Puccinia Phlei pratensis Erick. Ad folia *Phlei pratensis* ad Třešť (Bd).

Puccinia molinae Tul. Ad folia *Moniliae coeruleae* in voragine Kotlina dicta in montibus Jeseníky (Pbr).

Puccinia stipae (Opiz) Hora. Ad folia *Stipae capillatae* in colle

Brennhügel et Šibeničnick ad Mikulov, in elivo Stránská skála ad Brno (Pbr).

Puccinia sessilis Schneid. Aecidia ad folia *Polygonati multiflori* ad fl. Dyje inter Devět mlýnů et Trouznický mlýn pr. Znojmo, ad Želešice pr. Brno (Pbr).

Puccinia lolii Niess. Ad folia *Holci mollis* ad Zdeňkov, Rosičky, Dobrá Voda et Mrákotín pr. Telč (Pbr).

Puccinia coronata Corda. Ad folia *Calamagrostidis lanceolatae* ad Dobrá Voda pr. Telč. (Pbr).

Puccinia litoralis Rostr. Ad folia *Iunci Gerardi* ad Rakvice pr. Břeclav (Pbr).

Puccinia dispersa Erick. Ad folia *Lycopsidis arvensis* ad Nová Říše saepissime (Bd).

Puccinia caricicola Fuck. Ad folia *Caricis supinae* ad Dubňany pr. Hodonín in silvis (Pbr).

Puccinia linosyridis-caricis E. Fisch. Ad folia *Caricis humilis* in colle Šibeničnick ad Mikulov, in colle Leskoun ad Vedrovice pr. Mor. Krumlov, ad Devět mlýnů pr. Znojmo; ad Kúty in Slovenia occid. (Pbr).

Aecidia in foliis *Asteris linosyridis* ad Devět mlýnů pr. Znojmo (Pbr).

Puccinia paludosa Plowr. Aecidia in foliis *Pedicularis palustris* ad Šutov pr. Kralovany in Slovenia (Pbr).

Puccinia cynodontis Desm. Ad folia *Cynodontis dactyli* ad Rohatec pr. Hodonín et ad Kúty in Slovenia occidentali (Pbr).

Puccinia oreoselini (Strauss) Fuck. Ad folia *Peucedani Oreoselini* ad Dubňany pr. Hodonín (Pbr).

Puccinia athamanthae Lindr. In foliis *Peucedani cervariae* in declivitate supra viam a Smolné Jevíčko versus (Bd).

Puccinia scorzonericola Tranzsch. Ad folia *Scorzonerae humilis* ad Zdeňkov pr. Telč (Bd et Pbr).

Puccinia divergens Bub. Ad folia *Carlinae vulgaris* in colle Hég ad Jevíčko (Bd).

Puccinia Cyani (Schleich.) Pass. Ad folia *Centaureae cyanus* ad Višňová pr. Mor. Krumlov (Bd).

Puccinia tinctoriicola Magn. Ad folia *Serratulae tinctoriae* in pratis ad Rakvice et Přítluky (Pbr).

Puccinia artemisiella Syd. Ad folia *Artemisiae vulgaris* ad Mikulov (Pbr).

Puccinia absinthii D. C. Ad folia *Artemisiae Absinthii* ad Zaječí et Přítluky pr. Břeclav et ad Znojmo (Pbr).

Puccinia Čelakovskyana Bub. In foliis *Galii cruciatae* in litore Úsobrnkae fl. infra Jaroměřice ad Jevíčko (Bd).

Puccinia asperulae aparinis Pbr. Ad folia *Asperulae aparinis* inter Týn et Lipník n. B. ad rivum úsobrněnssem inter Jaroměřice et Jevíčko (Bd).

Puccinia Liliacearum Duby. Ad folia *Ornithogali umbellati* ad Vranovice pr. Brno (Pbr).

Puccinia annularis (Strauss) Wint. Ad folia *Teucrii chamaedris* in declivitate Klucanina ad Tišnov (Bd).

Puccinia saxifragae Schlecht. Ad folia *Saxifragae granulatae* ad Lišeň prope Brno et inter Vel. Meziříčí et Vel. Oslavice (Pbr).

Puccinia glechomatis D. C. Ad folia *Glechomatis hederacei* ad Bečvam fl. pr. Krásno et Val. Meziříčí (Pbr).

Puccinia grisea (Strauss) Wint. Ad folia *Globulariae Willkommii* in clivo Roháč ad Sulov et in colle „Baba“ supra pagum Omšená ad Trenč. Teplíce in Slovenia occidentali (leg. Dr. Suza).

Puccinia millefolii Fuck. Ad folia *Achilleae millefolii* ad Rakvice pr. Břeclav (Bd).

Puccinia arenariae (Schum.) Wint. Ad folia *Dianthi barbati* in Tišnov (Bd).

Ad folia *Stellariae holostae* ad arcem Tempelštejn pr. Jamolice ad Mor. Krumlov (Pbr).

Puccinia asari Kunze. Ad folia *Asari europaei* in convalli Závist ad Tišnov (Bd).

Puccinia valantiae Pers. Ad folia *Galii cruciati* ad Krásno pr. Val. Meziříčí (Pbr).

Uredo anthoxanthina Bub. In foliis *Anthoxanthi odorati* ad margines silvarum pr. Zdeňkov ad Telč (Pbr.)

Auriculariineae.

Platyglœa nigricans Schröt. Ad ramos *Tiliae* sp. ad Valtice, Letovice, Znojmo, Uherčice ad Znojmo, Jemnice, Nové Město na Mor. (Pbr); in Náklo pr. Olomouc, Dol. Kounice, Nezamyslice, Hoštice ad Zdounky, Vel. Opatovice pr. Jevíčko, Set. Magdalena ad Nová Říše, horti Schlägriani Brunae, in colle Calvaria ad Jaroměřice pr. Jevíčko, Nová Říše in Moravia, ad Staré Město pr. Jindřichův Hradec, Okrouhlice ad Něm. Brod (Bd), ad Telč (Bd et Pbr).

Tremellineae.

Tremellodon gelatinosum Scop. Ad caudices vetustos infra Pra-
děl monte et Karlova Studánka in Jeseníky montibus (Pbr).

Exobasidiineae.

Exobasidium oxycocci Rostr. Ad folia *Vaccinii oxycocci* in paludosis Vel. Jezerník montis in Jeseníky montibus (Pbr).

Exobasidium vaccinii uliginosi Boud. Ad folia *Vaccinii uliginosi* eodem loco (Pbr).

Hymenomycetinae.

Gloeopeniophora incarnata (Pers.) Höhn. und Litsch. Ad ramos *Coryli avellanae* in convalli Březinka ad castellum in Třešť (Bd).

Peniophora sanguinea Höhn. et Litsch. Ad caudicem infra Praděd monte in Jeseníky montibus (Pbr).

Radulum orbicularae Fr. Ad Iglaviam (Jihlava) (Pbr).

Merulius tremellosus Schrad. Ad caudicem betulinum ad Netín pr. Vel. Meziříčí, ad Kohoutovice pr. Brno (Pbr).

Polyporus sulphureus Fr. Ad Litovel (Pbr).

Schizophyllum alneum (L.) Schröt. Ad Hluboček pr. Olomouc (Pbr).

Phallus imperialis Kalchbr. In arenosis silvae pinastris ad Rohatec pr. Hodonín (Pbr).

Nyctalis lycoperdoides (Bull.) Schröt. Ad pilea *Lactarii piperati*, *Russulae foetentis* inter Bohuslavice et Nov. Říše (Bd).

Astraeus stellatus Scop. Humi in declivitatibus ad flumen Dyje pr. Znojmo (Pbr).

Geaster rufescens Pers. In silva ad Heraltice pr. Třebíč (Pbr).

Geaster coronatus (Schäffer) Schröt. In silva ad Červený Hrádek pr. Nov. Říše (Bd et Pbr), in colle Strážov pr. Vohančice ad Tišnov (Bd), ad Dubňany pr. Hodonín, ad Hoštice pr. Zborovice (exemplaria, quae magnitudine sua mirabilia sunt); in silva ad Důl Holubyho in montibus Tatrensibus in Slovenia (Pbr).

Geaster minimus Schwein. In Nesselgrat in montibus Tatrensibus (Pbr).

Geaster fornicatus (Huds.) Fr. In collibus Pavlovensibus in Moravia meridionali (leg. prof. Valoušek).

Lycoperdon echinatum Pers. In loco exercitationis militaris in Pánov ad Hodonín, infra monte Praděd in Jeseníky montibus (Pbr).

Lycoperdon spadiceum Pers. In arenosis inter Dubňany et Hodonín (Pbr).

Lycoperdon pusillum Batsch. In arenosis ad Kúty in Slovenia occid., et in arenosis ad Rohatec pr. Hodonín (Pbr).

Lycoperdon gemmatum Batsch. Ad Třebíč et in montibus Tatrensibus (Pbr).

Lycoperdon hiemale (Bull. p. p.) Vitt. ad Hodonín Dubňany versus, ad Rohatec pr. Hodonín (Pbr).

***Lycoperdon caudatum** Schröt. Ad Netín pr. Vel. Meziříčí in silva (Pbr).

Lycoperdon umbrinum Pers. In arenosis ad Rohatec pr. Hodonín, ad Macocha, locum praeruptum. Forma ad var. *elongatum* Berk. spec-tans (Pbr).

Scleroderma Bovista Fr. Humi ad Vohančice pr. Tišnov (Pbr).

Bovista plumbea Pers. Inter Hodonín et Dubňany (Pbr), ad Nov. Říše (Bd).

Nidularia confluens Fr. et Nord. In cortice ligni ad Třebíč (anno 1910 Rud. Dvořák legit).

Fungi imperfecti.

Phyllosticta berberidis Rbh. Ad folia *Berberidis vulgaris* ad Mohelno (Pbr).

Phyllosticta destructiva Desm. Ad folia *Malvae spec.* in Nov. Říše (Pbr).

***Phyllosticta hydrophila** Speg. Ad folia *Nymphaeae sp.* ad Přítuky pr. Břeclav (Bd et Pbr).

***Phyllosticta orobella** Sacc. Ad folia *Orobi verni* in convalli Pustý Žleb ad Macocha, locum praeruptum (Pbr).

Phyllosticta praetervisa Bub. Ad folia *Tiliae sp.* in Karlova Studánka in Silesia (Pbr).

***Phyllosticta tiliae** Sacc. et Speg. Ad folia *Tiliae sp.* eodem loco (Pbr).

Phoma melaena (Fr.) Mont. et Dur. Ad caules *Astragali onobrychidis* ad Pouzdřany pr. Hustopeč (Pbr).

Ad caules *Astragali glycyphyllos* in horto botanico Olomucii (Pbr).

***Phoma gregaria** Syd. Ad zoocecidia *Ceutorhynchi Thlaspi arvensis* ad Lelekovice pr. Brno (leg. Dr. Hruby).

***Phoma oleracea** Sacc. Ad caules *Antirrhini majoris* in horto arcis Vranov ad Znojmo (Bd).

***Phoma oleracea** Sacc. var. *scrophulariae* Sacc. Ad caules *Scrophulariae nodosae* in Pisárky pr. Brno. Sporis 4.5μ — 5.4μ longis ac 1.8μ latis (Pbr).

Ad *Brassicam oleraceam sabaudam* in Brno-Černá Pole (Pbr).

***Phoma complanata** Desm. Ad caules *Herachi sphondylii* ad Olomučany pr. Blansko (Pbr).

Phoma trachelii Allesch. Ad caules *Campanulae trachelii* ad Čebín pr. Tišnov, Pustý žleb, convallis ad Macocham pr. Sloup (Pbr).

***Phoma seseli** Holl. Ad caules *Seseli hyppomarathri* ad Mohelno (Pbr).

Phoma Zopfiana Allesch. Ad caules *Ononidis spinosae* ad Slatinky pr. Prostějov, ad Hovorany pr. Hodonín, ad Želešice pr. Brno (Pbr).

***Phoma silvatica** Sacc. Ad caules *Melampyri sp.* in declivitate Kamenný kopec ad Brno (Pbr).

Phoma veronicae Roum. var. **veronicae teucarii** Picbauer var. n.

Plodnice kulovité, 187—300 μ průměru, někdy ellipsoidní (rozměru 280 $\times$ 224 μ) pokožkou kryté, tmavé, pod drobnohledem žlutohnědé, otevřené pórem 37·5—56 μ širokým, kol ústí slabě temněji vroubené. Výtrusy váleovité, na obou stranách zaoblené, často ledvinkovitého tvaru, nebo k jednému konci zúžené, 5—7·7 μ dlouhé, 2—2·5 μ široké.

Na odumřelých stoncích *Veronica teucrium* na Turoldu v Pavlovských kopech. 15. V. 1927 leg. Picbauer.

Pycnidii sphaeroideis, 187—300 μ diam., aliquando ellipsoideis (ca. 280 $\times$ 224 μ diam.), epidermide tectis, obscuris, microscopice contextu parenchymatico luteo-brunneo, poro 37·5—56 μ lato apertis, circa porum contextu vix obscuriore.

Sporulis cylindricis, utrinque rotundatis, saepe reniformibus, vel uno extremo attenuatis, 5—7·7 μ longis, 2—2·5 μ latis.

Habitat in caulibus emortuis *Veronicae teucarii* in declivi Turolde ad Mikulov oppidum, Moraviae meridionalis. 15. V. 1927 ipse legi.

***Phoma phlomidis** Thüm. Ad caules *Phlomidis tuberosae* in horto botanico Olomucii. Spor. 9·6—13 μ longis ac 2 μ latis (Pbr).

Phoma salviae Brun. Ad caules *Salviae verticillatae* ad Klentice pr. Mikulov (Pbr).

***Phoma lutescens** Kab. et Bub. Ad caules *Lamii galeobdolonitis* in convalli Pustý žleb ad Macocha pr. Sloup (Pbr).

***Phoma bryoniae** Sacc. et Syd. Ad caules *Bryoniae dioicae* in „Vinohrady“ ad Pisárky pr. Brno (Pbr). Unacunque cum *Didymella bryoniae* Rehm.

Phoma urticae Schulz. et Sacc. Ad caules *Urticae dioicae* in declivitate Žižkův vřeh ad Brno, ad Hádý pr. Brno (Pbr).

Phoma acuta Fuck. Ad caules *Scrophulariae nodosae* ad Ketkovice pr. Náměšť n./Osl., ad Bobrava fl. ad Želešice et Ořechov pr. Brno (Pbr).

Phoma vulgaris Sacc. Ad caules *Clematidis vitalbae* in clivo Kotelná in collibus Pavlovensibus (Pbr).

Phoma polygramma (Fr.) Sacc. Ad caules *Ballotae nigrae* in „Vinohrady“ in Žlutý kopec pr. Brno (Pbr).

***Phomopsis mazzantioides** Petr. Ad caules *Galii veri* ad Brázdův mlýn pr. Telč (Bd et Pbr).

Phomopsis pseudacaciae (Nitsch.) v. Höhn. Ad ramos *Robiniae pseudacaciae* ad silvam Wilsoni pr. Brno (Pbr).

***Sclerophoma pruni** Died. Ad ramulos *Pruni spinosae* in declivitate Žižkův vreh ad Brno (Pbr).

***Dendrophoma pruinosa** Sacc. Ad corticem *Fraxini excelsioris* ad Hrubá Voda pr. Olomouc (Pbr).

Cytospora salicis (Corda) Rbh. Ad ramulos *Salicis albae* ad Moravany pr. Brno (Bd).

Rabenhorstia Tiliae Fr. Ad ramos *Tiliae parvifoliae* ad Rajhrad (Bd et Pbr).

Cytospora iuglandina Sacc. Ad ramulos *Iuglandis regiae* in colle Koží hora ad Brno (Pbr).

Cytospora cineta Sacc. Ad ramulos *Persicae vulgaris* et *Pruni spinosae* in declivitate Žižkův vreh pr. Brno (Pbr).

Cytospora rosarum Grev. Ad ramulos *Rosae caninae* eodem loco (Pbr).

Cytospora ambiens Sacc. Ad ramulos *Crataegi oxycanthae* in declivitate Kraví hora ad Brno (Pbr).

Sporonaema campanulae Petr. Ad folia *Campanulae rapunculoidis* ad Blučina pr. Brno, ad Jablonová pr. Žilina in Slovenia occidentali (Pbr).

***Ascochyta Molleriana** Wint. Ad folia *Digitalis purpureae* in horto botanico scholae agronomicae in Brno (Pbr).

Ascochyta malvae H. Zimmermann. Ad folia *Malvae rotundifoliae* in Popice ad Hustopeč (Pbr).

Diplodina galii (Niessl.) Sacc. Ad caules *Galii molluginis* ad Zboněk pr. Letovice, in declivitate Hády ad Brno (Pbr).

Diplodina vitalbae (Br. et Har.) Allesch. Ad caules *Clematidis rectae* ad Ketkovice (Pbr).

Diplodina menthae Picbauer. Ad caules *Menthae longifoliae* ad Anenský mlýn pr. Ořechov ad Brno (Pbr).

***Diplodina atriplicis** Westerg. Ad caules *Atriplicis tataricae* in Vranovice ad Brno (Pbr).

Diplodina medicaginis Oud. Ad caules *Medicaginis sativae* inter Ořechov et Troubsko (Pbr).

**Diplodina pimpinellae* Holl. Ad caules *Pimpinellae saxifragae* ad Klepáčov pr. Blansko (Bd).

Septoria paeoniae West. var. *berolinensis* Allesch. In foliis *Paeoniae officinalis* in Olomúčany pr. Blansko (Bd).

**Septoria podagrariae* Lasch. var. *pimpinellae magnae* Kab. et Bub. Ad folia *Pimpinellae saxifragae* ad Zborovice, ad Mohelno (Pbr).

Septoria astragali Desm. Ad folia *Astragali glycyphyllos* ad Set. Carolum pr. Telč (Pbr).

**Septoria glaucis* Syd. Ad folia *Glaucis maritimae* ad Rakvice pr. Břeclav (in communi excursionem primus Bd invenit).

Septoria convolvuli Desm. Ad folia *Convolvuli sepium* ad Rakvice pr. Břeclav (Pbr).

Septoria hepaticae Desm. In foliis *Hepaticae trilobae* in convalli ad Sloup (Pbr).

Septoria dianthi Desm. In foliis *Dianti barbathi* in publico sepulcrorum loco in Netín pr. Vel. Meziříčí (Pbr).

**Septoria grossulariae* (Lib.) West. var. *longispora* Ferr. Ad folia *Ribis grossulariae* in Drahanovice et Droždín pr. Olomouc. Sporibus usque $60\ \mu$ longis. Mihi videtur hanc variationem cum *Septoria grossulariicola* Mass. congruere posse (Pbr).

**Septoria fusispora* Died. Ad folia, vaginas culmosque *Triticum glauci* ad Modřice pr. Brno (Pbr).

Septoria tritici Desm. Ad folia *Triticum vulgare* ad Uh. Brod (leg. Procházka).

Septoria glumarum Pass. Ad glumas *Triticum vulgare* ad Morkovice (Bd).

Septoria stachydis (Rob. et Desm.). Ad folia *Stachydis alpinae* in voragine Kotlina dicta in Jeseníky montibus (Pbr).

Stachydis silvaticae ad Dukovany pr. Mor. Krumlov (Pbr).

**Septoria scutellariae* Thüm. Ad folia *Scutellariae galericulatae* ad Zdeňkov pr. Telč (Bd).

Septoria tinctoriae Brun. Ad folia *Serratulae tinctoriae* ad Soběšice pr. Brno (Pbr).

Septoria cruciatae Rob. et Desm. Ad folia *Galii rotundifolii* ad Rosičky fundum pr. Telč (Pbr). Sporibus $26-34\ \mu$ longis ac $2.5-3\ \mu$ latis.

Septoria cornicola Desm. Ad folia *Corni sanguineae* ad Plumlov pr. Prostějov (leg. Fr. Pálka).

Septoria veronicae Desm. Ad folia *Veronicae spicatae* ad Ketkovice pr. Náměšť n./Oslavou (Pbr).

Ad folia *Veronicae hederuefoliae* ad Hradiště pr. Znojmo. Sporis 35—50 μ longis ac 1·5 μ latis (Pbr).

Septoria globulariae Sacc. Ad folia *Globulariae Wilkommii* in colle Sv. Kopeček ad Mikulov. Sporis 16—22—38 μ longis ac 1 μ latis (Pbr).

***Rhabdospora veronicae** Holl. Ad caules *Veronicae teucrii* in colle Vršatec ad Vlára angustias (Pbr).

Ad caules *Veronicae spicatae* in colle Křížová hora ad Mor. Krumlov. Sporis 26 μ longis ac 1·7 μ latis (Pbr).

Rhabdospora onnobrychidis Syd. Ad caules *Onnobrychidis sativae* in colle Nebovidský kopec ad Brno (Pbr).

Rhabdospora euphrasiae Picbauer. Ad caules *Euphrasiae Rostkovicianae* ad Kohoutovice pr. Brno (Pbr).

Rhabdospora clinopodii Allesch. Ad caules *Clinopodii vulgaris* in convalli Pustý žleb ad Macocha, locum praeruptum (Pbr).

***Rhabdospora campanulae** Fautr. Ad caules *Campanulae trachelii* eodem loco (Pbr).

Rhabdospora pachyderma Kab. et Bub. Ad scapos *Plantaginis mediae* in hortis Heulos ad Jihlava (Pbr). Sporis 19—22 μ longis ac 1·5 μ latis.

Rhabdospora primulae Picbauer sp. n.

Plodnice více méně nepravidelně roztroušené, často v nepravidelných skupinách, s počátku pokožkou kryté, později nahé, černé, z temně hnědého parenchymatického pletiva, ellipsoidní, rozměru 450—562 $\times$ 280—340 μ , na svrchní straně zploštělé, opatřené pórem asi 56 μ širokým.

Výtrusy četné, nitkovité, ke koncům obyčejně zašpicatělé, řidčeji všude stejně silné, 34—49 μ dlouhé, 1·9—2 μ široké, bez přehrádek nebo s 2 nezřetelnými přepážkami.

Na odumřelých stvolech *Primula officinalis* v Kotlině na Jeseníku.

Pycnidiis plus minusve irregulariter disseminatis, saepe irregulariter aggregatis, primum epidermide tectis, deinde denudatis, nigris, contextu parenchymatico obscure-brunneo, ellipsoideis, 450—562 $\times$ 280—340 μ diam., superiore parte depressis, poro ca. 56 μ lato apertis.

Sporulis multis, filiformibus, rectis vel leniter inflectis, saepissime utrinque attenuatis, rarius non attenuatis, 34—49 μ longis, 1·9—2 μ latis, aseptatis, vel non satis clare biseptatis.

Habitat ad scapos emortuos *Primulae officinalis* loco Kotliny dicto in Jeseníku montibus. 28. IX. 1927 ipse legi.

**Phlyctaena lappae* (Karst.) Sacc. Ad caules *Lappae spec.* ad stationem Hrušovany-Šanov in Moravia merid. (Pbr).

Phlyctaena vagabunda Desm. Ad caules *Oleatidis rectae* in declivitate Žižkovo návrší ad Brno. Sporis 23—27 μ longis ac 2—2.5 μ latis (Pbr).

**Dilophospora graminis* Desm. In culmis *Festuae ovinae* et *Anthoxanthi odorati* in declivitate Klucanina ad Tišnov (Bd).

Sphaeropsis visci (Sollm.) Sacc. Ad folia *Visci albi* ad Borač pr. Tišnov (leg. Dr. Suza).

**Diplodia euphrasiae* (Oud.) Sacc. Ad caules *Euphrasiae Rostkovičanae* in agris et ad viam in declivitate Hornek pr. Brno (Pbr).

**Diplodia grossulariae* Sacc. et Schulz. Ad ramulos *Ribis alpini* in convalli Pustý žleb ad Macocha, locum praeruptum (Pbr).

Ribis grossulariae in elivo Žižkovo návrší ad Brno (Pbr).

**Diplodia persicae* Sacc. Ad ramulos *Persicae vulgaris* in declivitate Žižkův vrch ad Brno (Pbr).

Diplodia iuglandis Fr. Ad ramulos *Juglandis regiae* in declivitate Koží hora ad Brno (Pbr).

**Diplodia lilacis* West. Ad ramulos *Syringae vulgaris* in declivitate Žlutý kopec ad Brno (Pbr).

**Diplodia cerasorum* Fuck. Ad ramulos *Pruni cerasi* in declivitate „Vinohrady“ ad silvam Wilsoni pr. Brno (Pbr).

**Hendersonia campanulae* Holl. Ad caules *Campanulae sibiricae* in declivitate Větrníky ad Dražovice pr. Vyškov (Pbr).

Hendersonia canina Brun. Ad ramulos *Rosae sp.* ad Mohelno pr. Náměšť n./O. (Pbr).

**Camarosporium syringae* Cooke et Mass. Ad ramulos *Syringae vulgaris* in declivitate Žlutý kopec et in Pisárky ad Brno (Pbr).

Camarosporium coluteae (Peck. et Clint.) Sacc. Ad ramos *Coluteae arborescentis* ad institutum caecorum in Brno (Pbr).

Camarosporium laburni (West.) Sacc. Ad ramos *Cytisi laburni* ad Znojmo (Pbr).

Rabenhorstia tiliae Fr. Ad ramos *Tiliae cordatae* ad Rajhrad pr. Brno (Pbr et Bd).

Gloeosporium tiliae Oud. var. *maculicolum* Allesch. Ad folia *Tiliae sp.* ad fundum in Bitovánky ad Želetava, in sanatorio in Tišnov (Bd).

**Gloeosporium myrtilli* Allesch. Ad folia *Vaccinii myrtilli* ad Netín pr. Vel. Meziříčí (Pbr).

Gloeosporium betulinum West. Ad folia *Betulae albae* in silva Hrabýň ad Čes. Těšín (leg. Nakládal).

Myxosporium aucupariae Allesch. Ad ramos *Crataegi oxyacanthae* in clivo Kraví hora ad Brno (Pbr).

Gloeosporium carpini (Lib.) Desm. Ad folia *Carpini betuli* ad Krásno et Val. Meziříčí, in Lednice, ad Znojmo (Pbr).

Marsonina rosae (Lib.) Died. Ad folia *Rosae* sp. ad Mohelno, Dukovany et Jamolice pr. Mor. Krumlov (Pbr).

Marsonina Tulasnei (Sacc.) Died. Ad folia *Aceris pseudoplatani* in convalli Pustý žleb ad Sloup (Bd).

Pestalozzina hendersonioides (Fautr. et Laub.) Died. Ad caules *Bupleuri falcati* a Želešice ad meridiones versus pr. Brno (Pbr).

Melanconium sphaeroideum Link. Ad ramos *Alni glutinosae* ad Hodonín (Pbr), ad Telč (Pbr).

***Cylindrosporium ranunculi** (Bonord.) Sacc. Ad folia *Ranunculi bulbosi* in clivo Klucanica pr. Tišnov (Bd).

Leptothyrium alneum (Lév.) Sacc. Ad folia *Alni glutinosae* ad Dobrá voda pr. Třebíč (Pbr).

Pirostoma circinnans Fr. Ad culmos foliaque *Phragmitis communis* ad Rakvice pr. Břeclav (Pbr).

Dinemasporium hispidulum (Schrad.) Sacc. var. **herbarum** Cooke. Ad caules *Ballotae nigrae* in declivitate Žlutý kopec ad Brno (Pbr).

Oedocephalum glomerulosum (Bull.) Sacc. Ad semina *Allii cepae* in Brno (Pbr).

Microstoma Juglandis (Béreng.) Sacc. Ad folia *Juglandis regiae* ad Tišnov (Bd).

Sepedonium chrysospermum (Bull.) Fr. Ad *Boletos* et *Agaricinas* ad Nová Říše (Bd).

***Ovularia decipiens** Sacc. Ad folia *Ranunculi acris* in convalli „Kamenné“ ad Úsobrno pr. Jevíčko (Bd).

Ovularia asperifolia Sacc. Ad folia *Symphyti officinalis* in declivitate Babi lom ad Vranov pr. Brno (Pbr).

Ovularia bulbifera (Fuck.) Sacc. Ad folia *Sanguisorbae officinalis* ad Zdeňkov et Nov. Říše ad Telč, ad Hrachovec pr. Val. Meziříčí (Pbr).

Mycogone rosea Link. Ad pileos *Amanitae muscaria* inter Bohuslavice et Nová Říše (Bd).

***Verticillium epimyces** Berk. et Brun. Ad *Elaphomyces cervinum* in silva Černochoy ad Netín pr. Vel. Meziříčí (Pbr).

Trichothecium roseum Link. Ad nucleos *Juglandis regiae* in Brno (Pbr).

Ramularia sambucina Sacc. Ad folia *Sambuci racemosae* in silva „Pahorek“ inter Zdeňkov et Nov. Říše (Bd).

Ramularia coccinea (Fuck.) Vestergr. Ad folia *Veronicae officinalis* ad Nov. Říše (Bd).

Ramularia calcea Ces. Ad folia *Glechomae hederaceae* infra schola in Nov. Říše, ad Nebovidy pr. Brno (Pbr).

Ramularia phyteumatis Sacc. et Wint. Ad folia *Phyteumatis spicati* in Kriváň monte in Fatra montibus (Pbr).

Ramularia aiugae Sacc. Ad folia *Aiugae reptantis* in colle Javořice ad Telč (Bd et Pbr).

Ramularia alismatis Fautrey. Ad folia *Alismatis plantaginis* ad piscinam pr. Ptáčov ad Třebíč (Pbr).

***Ramularia cervina** Speg. Ad folia *Homogynis alpinae* in voragine Kotlina in Jeseníky montibus (Pbr).

***Ramularia doronici** (Sacc.) Lindau. Ad folia *Doronici austriaci* ad Opava fl. pr. Karlova Studánka in Silesia (Pbr).

Ramularia lappulae Picbauer sp. n. 21. VI. 1926 in schedis.

Skvrny okrouhlé, hnědé, kolem žlutěhnědě vroubené, na obou stranách listů patrné, často vespolek splývající. Podušky výtrusů bělavé, hlavně na spodní straně listů.

Stopky konidiové jednoduché, kol 20 μ dlouhé. Konidie kyjovité, rovné, nebo mírně prohnuté, nahoře i dole zaoblené, uprostřed s přehrádkou nebo bez ní, 40—77 μ dlouhé (nejčastěji 58 μ) a 3·5—4 μ široké.

Na živých listech *Lappula echinata* Gil. (*EchinospERMum lappula* Lehm.) na Kamenném kopci u Lískovce. Sbíráno 23. V. 1926.

Maculis amphigenis, brunneis, rotundatis, circa luteo-brunneo limitatis, saepe cunfluentibus. Caespitulis albidis, praecipue hypophyllis.

Conidiophoris simplicibus, ca. 20 μ longis. Conidiis fustiformibus, rectis, vel leniter inflectis, utrinque rotundatis, medio uniseptatis vel aseptatis, 40—77 μ longis (saepissime 58 μ) ac 3·5—4 μ latis.

Habitat in foliis vivis *Lappulae echinatae* Gil. in clivo Kamenný kopec dicto ad Nový Lískovec pr. Brno. 23. V. 1926 ipse legi.

***Fusoma vastator** Speg. Ad folia *Ulmí sp.* ad Brtnice (Magistratus silvaticus fundi Collalto).

Mastigosporium album Riess. Ad folia *Alopecuri pratensis* ad Znojmo, Šatov, Devět mlýnů (Pbr).

Cercospora nesleana Baudyš et Picbauer. Ad folia *Nesliae paniculatae* ad Nová Říše pr. Telč (Bd).

Hadrotrichum virescens Sacc. et Rqm. Ad folia *Agrostidis albae* in Ždár in Moravia (Bd).

Scolecotrichum graminis Fuck. Ad folia *Secalis cerealis* ad Sloup.

Ad folia *Triticici vulgaris* ad Uh. Brod (leg. Procházka).

Cladosporium fasciculare (Pers.) Fr. Ad folia *Allii schoenoprasii* ad fundum Valečov pr. Něm. Brod (Bd).

Cladosporium fuliginenum Bonord. Ad pileos *Lepiotae* sp. ad Rakvice, ad *Polyporum squamosum* ad Podivín et Lanštorf pr. Břeclav (Pbr).

Polythrincium trifolii Kunze. Ad folia *Trifolii campestri* in declivitate Klucanina ad Tišnov (Bd).

***Heterosporium allii** Ellis et Mart. Ad folia *Allii sativi* ad Karlín pr. Hodonín (Administratio fundi Karlín).

Heterosporium gracile Sacc. Ad folia *Iridis germanicae* in Olo-moučany ad Blansko, in Třešť (Bd).

Coniothecium complanatum (Nees.) Sacc. Ad ramulos *Betulae carpathicae* in voragine Kotlina dieta in Jeseníky montibus (Pbr).

Macrosporium granulosum Bub. Ad fructum *Cucurbitae peponis* ad Nov. Přerov pr. Mikulov (Bd).

Macrosporium trichellum Arcang. et Sacc. Ad folia *Cameliae japonicae* in caldariis in Vel. Meziříčí (Pbr).

Alternaria tenuis Nees. Ad folia *Nicotianae tabaci* ad Rimavská Sobota in Slovenia (leg. Dr. Hušák).

Cercospora mercurialis Pass. Ad folia *Mercurialis annuae* ad Valtice in Moravia merid. (Pbr).

***Cercospora meliloti** Oud. Ad folia *Meliloti officinalis* in declivitate Březinská horka ad Tišnov (Bd).

Cercospora dubia (Riess.) Wint. Ad folia *Atriplicis* sp. ad Brno (Pbr).

Dendryphium curtum Berk. et Br. Ad caules *Lupini* sp. in Písárky ad Brno (Pbr).

Stilbella erythrocephala (Ditm.) Lind. Ad *finum cuniculorum* ad Kúty in Slovenia occidentali (Pbr).

Isaria brachiata (Patsch.) Schum. In fungo detricto ad Lišeň pr. Brno; ad *Tremellodom gelatinosum* ad Karlova Studánka infra Praděd monte (Pbr).

Stysanus stemonites (Pers.) Corda. Ad Caules *Dahliae variabilis* in Brno (Bd).

Tilachlidium tomentosum (Schr.) Lind. Ad corpora *Stemonitis* sp. et *Trichiae* sp. in Jeseníky montibus (Pbr).

Tuberculina persicina Ditm. In aecidiis *Uromycis pisi* in Euphrat-

bia cyparissias in clivo Hornek ad Lišeň, in „Valy“ inter Bojkovice et Bánov (Pbr).

Puccinia arrhenatheri ad Granický mlýn pr. Znojmo (Pbr).

Volutella ciliata (Alb. et Schw.) Fr. Ad rhizomata *Dahliae variabilis* in Brno (Bd).

Fusarium sclerodermatis Oud. Ad *Scleroderma vulgare* ad aedem sacram in Stará Říše (Bd).

Fusarium nivale (Fr.) Sorauer. Ad folia *Secalis cerealidis* ad Lhota apud Choryně pr. Val. Meziříčí.

Ad folia *Triseti flavescentis* ad Rožnov p. Radh. (leg. ing. Brada). Sporis 15—38 μ longis ac 3·8—4 μ latis, 1—3 septatis.

Fusarium roseum Link. Ad caules *Heraclei sphondylii* in Olomoučany pr. Blansko (Bd).

Ad folia *Brassicae oleraceae* in Brno (Pbr).

**Fusarium lolii* (Smith.) Sacc. Ad fructus *Lolii perennis* ad Rožnov p. Radhoštěm (leg. Ing. Brada).

**Fusarium sarcocroum* (Desm.) Sacc. Ad ramulos *Sarothamni vulgaris* loco „Ouvary“ dicto ad Netín pr. Vel. Meziříčí (Pbr).

**Fusarium hibernans* Lind. Ad folia *Lolii anglici* ad Rožnov p. Radh. (leg. Ing. Brada).

**Fusarium zeae* (West.) Sacc. Ad cales abscisos *Zeae vulgaris* ad Přitluky pr. Břeclav (Bd et Pbr).

Fusarium pallens (Nees.) Sacc. Ad ramulos *Alni glutinosae* ad stationem Letovice (Pbr).

**Fusarium mali* Alesch. Ad ramos *Piri mali* in vico Sadová in Brno (Bd).

Fusarium sclerodermatis Oud. var. *lycoperdonis* Piebauer var. n. Delšími, 43—58 μ dlouhými a 4 μ širokými výtrusy od typu rozdílné. Na *Lycoperdon* sp. u zříceniny hradu Templštejn u Jamolic blíže Mor. Krumlova.

Sporis longioribus, 43—58 μ longis ac 4 μ latis a typo differt. Habitat in *Lycoperdone* sp. ad ruinam arcis Templštejn ad Jamolice pr. Mor. Krumlov. 25. VIII. 1928 ipse legi.

Vermicularia saponariae Allesch. Ad caules *Saponariae officinalis* ad Kúty in Slovenia occidentali (Pbr).

Vermicularia trichella Fr. Ad folia *Evonymi japonici* in caldario in Brno (Bd).

Vermicularia dematium Fr. Ad caules *Heraclei sphondylii* in Olomoučany ad Blansko (Bd).

Myrothecium inundatum Tode. Ad pileos *Russularum* in silva Pisárky ad Brno, in colle Květnice ad Tišnov (Pbr).

Exosporium tiliae Link. Ad ramulos *Tiliae* sp. ad Třebíč (Pbr), in Nová Říše (Bd).

Rhizoctonia violacea Tul. Ad radices *Humuli lupuli* ad Roudnice in Bohemia (Bd).

Sclerotium rhizoides Auserw. Ad folia *Agrostidis vulgaris* ad Světlav castellum ad Bojkovice, in declivitate Klucanina ad Tišnov, in declivitate Vrchory ad Úsobrno pr. Jevíčko (Bd).

Calamagrostidis Hallerianae in colle Humberk inter Úsobrno et Šubířov pr. Jevíčko (Bd).

13

W

W